



โรงพยาบาลบ้านนา (BANNAHOSPITAL)

CPG: Acute Diarrhea

ผู้จัดทำ : แพทย์หญิงกานติมา ใจรังสี

รหัส CPG – PCT – 014

แก้ไขครั้งที่ : 04 วันที่บังคับใช้ วันที่ 10 / 09 / 67

หน้าที่ 1 / 2

ซักประวัติและตรวจร่างกาย

- ลักษณะอุจจาระ สี เหลลว/เนื้อ > น้ำ, น้ำ>เนื้อ ,มูกเลือด
- ปริมาณครั้ง / วัน
- อาการร่วม เช่น ไข้ ปวดท้อง อาเจียน หน้ามืดเป็นลม
- ประวัติการรับประทานอาหาร และคนที่ร่วมรับประทานอาหารมีอาการปวดท้องหรือไม่เช่น อาหารทะเล
- ประวัติโรคประจำตัว
- ประวัติอาเจียน /ความสามารถในการดื่มเกลือแร่ทดแทน

ประเมินภาวะ Dehydration

Mild ขาดน้ำ 3-5%

ในผู้ใหญ่

- 1.BP,PRปกติ
- 2.กระหายน้ำเล็กน้อย
- 3.อ่อนเพลียเล็กน้อย
- 4.ความยืดหยุ่นผิวหนังดี
5. Capillary refill <2 วินาที

ในเด็กประเมินเพิ่ม ดังนี้

- 1.พฤติกรรมปกติ
- 2.กระหายน้ำเล็กน้อย
3. น้ำตา มีน้ำตา
- 4.กระหม่อมปกติ
- 5.เยื่อปูกปกติ
- 6.Urine specific <1.020

Moderate ขาดน้ำ 6-9%

ในผู้ใหญ่

- 1.pulseเบาเร็ว ความดันปกติหรือต่ำลง >10mmHg
- 2.อ่อนเพลียแทบเดินไม่ไหว,นั่งได้
- 3.เริ่มมีอาการตาลึกโป้
- 4.ผิวหนังมีความยืดหยุ่นปากกลาง
5. Capillary refill 2- 3 วินาที

ในเด็กประเมินเพิ่ม ดังนี้

- 1.พฤติกรรมกระสับกระส่าย
- 2.กระหายน้ำ ปากกลาง
- 3.น้ำตา มีน้ำตาลดลง
- 4.กระหม่อมหน้าบวมเล็กน้อย
5. เยื่อปูกแห้ง
6. Urine specific>1.020/บัสสาวะลดลง

Severe ขาดน้ำ ≥ 10% ขึ้นไป

ในผู้ใหญ่

- 1.เพลียมากนั่งไม่ไหว กระสับกระส่าย ตัวเย็น
2. pulseเบาเร็ว/ความดันต่ำลงมากกว่า 20 mmHg
- 3.ปากคอแห้งมาก /ตาลึกโป้มาก
- 4.ผิวหนังยืดหยุ่นไม่ดี ตั้งนานเกิน 2 sec

ในเด็กประเมินเพิ่ม ดังนี้

- 1.พฤติกรรมกระสับกระส่ายซึมมาก
2. กระหายน้ำมาก
- 3.น้ำตา ไม่มีน้ำตา
- 4.กระหม่อมหน้าบวมมาก
- 5.เยื่อปูกแห้งแตก
- 6.Urine specific >1.020/บัสสาวะน้อยกว่า0.5 cc/ kas/hr.

กลับบ้านได้

- ORS
- antiemetic เช่น Motilium
- Antispasmodic ในกรณีปวดมาก เช่นBuscopan
- ให้ATB เมื่อสงสัยเป็น Infectious diarrhea
- ให้คำแนะนำ
- แจกเอกสารการป้องกันและดูแลเบื้องต้น ก่อนมาโรงพยาบาล

แพทย์ พิจารณาAdmit

Treatment

- 1.เปิด IVF (0.9%NSS ,RLS,N/2)
- Moderate (Maintenance+5-7% def.คิดใน 24ชม.)หรือ ORS somllka 4 hr.
- Severe (M+7-10% def., 1/2 ส่วนให้ใน 8 hr., 1/2 ส่วน ให้ใน6 hr.
- Shock (40 ml/kg in ½ hr., 20 ml/kg in1 hr., 10 ml/kg in 4 hr.
- 2.CBC,Electrolyte,BUN,Cr,
 - 3.BPทุก1 hr.keepBP >90/60 mmHg ,pulse < 120/min
 - 4.Observe Urine
- Moderate: urine> 30 cc/hr.
 - Severe: urine > 0.5 cc/hr.
 - เด็ก 1 cc/kg/hr.
 - Record I/O



โรงพยาบาลบ้านนา
(BANNAHOSPITAL)

CPG: Acute Diarrhea	ผู้จัดทำ : แพทย์หญิงกานติมา ใจรังสี	
รหัส CPG – PCT – 014	แก้ไขครั้งที่ : 04 วันที่บังคับใช้ วันที่ 10 / 09 / 67	หน้าที่ 2 / 2

หมายเหตุ:

- 1.รายงานผู้รับผิดชอบงานระบาดวิทยา กลุ่มงานเวชศาสตร์ชุมชนและบริการปฐมภูมิเพื่อสอบสวนโรคกรณี อูจาระร่วง เสียชีวิต หรือมากกว่ามัยฐาน 5 ปี, อาหารเป็นพิษ เสียชีวิตหรือตั้งแต่ 2 รายจากชุมชนเดียวกันใน 1 วัน
- 2.ผู้รับผิดชอบงานระบาด ประสานรพสตในพื้นที่ ที่ผู้ป่วยอาศัยอยู่ขณะป่วย ดำเนินการดังนี้
 - ตรวจสอบข้อมูล
 - สอบสวนโรคโดยใช้แบบบันทึกการสอบสวนโรคทางระบาด
- 3.ผู้รับผิดชอบงานระบาดรายงาน สสอ. บ้านนา และสสจ.นครนายกตามลำดับ

ผู้จัดทำ	ผู้รับรอง	ผู้อนุมัติ
 (นางสาวกานติมา ใจรังสี) นายแพทย์ปฏิบัติการ	 (นายพสุ จันทรเพ็ญ) นายแพทย์ชำนาญการ ประธานคณะอนุกรรมการทีมPCT	 (นายฐาปกรณ์ พรประภาศักดิ์) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ โรงพยาบาลบ้านนา