

STANDING ORDER FOR PPH BANNA HOSPITAL

Progress Note	Date time	Order for one day	Date time	Order for continuation
		☐ Add Oxytocin 10 IU ใน IV fluid เมื่อ ย้าย มารดาเข้าห้องคลอด ปรับตาม Contraction ☐ ภายใน 1 นาที หลังคลอดให้ Oxytocin 10IU IM ☐ Methergine 0.2mg IM หลังรกลคลอด ใน กรณีไม่ มีข้อห้าม กรณีภาวะตกเลือดหลัง คลอด Standing order ☐ CBC , plt ☐ G/M PRC 2 - 4 Unit ☐ 0.9 % NSS 1000 cc IV Loading ☐ Uterine massage *First line treatment ☐ Oxytocin 10 unit เข้ากล้ามเนื้อ ☐ Oxytocin ขนาด 20-40 ยูนิต ในสารน้ำ 1000 ml โดยให้ 60 drop/min ☐ ถ้าเลือดหยุดแล้ว ให้ Oxytocin ขนาด 20 ยูนิต ใน 5% D/N/2 1000 ml IV 40 drop/min *Second line treatment ☐ Methergine 0.2 mg IM / IV ให้ซ้ำได้ทุก 15 นาที แต่ไม่เกิน 1 mg (หรือ 5 dose) *Third line treatment ☐ Cytotec 4 tab (1-4 เม็ด) ☐ oral ☐ Sublingual ☐ rectum ☐ ถ้าเลือดไม่หยุดหลังการรักษาภายใน 30 นาที ประสานส่งต่อแบบ Fast tract ☐ การรักษาอื่นๆ..... - Trasamine 1 gm. Iv slowly push or iv drip in NSS 100 ml in 5-10 min		
Name of Patient	Age	H.N.	A.N.	
Department of Service	Ward/Bed	Attending Physician		