


PRIMARY SURVEY

PROGRESS NOTE	ORDER FOR ONE DAY
DETECTION OF SHOCK V/S แกร็บ (เวลา _____) HR _____ bpm BP _____ mmHg	☐ Vital signs stable ☐ Hemorrhage Class: ☐ 1 (V/S stable) ☐ 2 (HR>100) ☐ 3 – 4 (BP drop) ☐ Non-hemorrhagic shock: _____
RESUSCITATION PHASE V/S หลัง load RLS (เวลา _____) HR _____ bpm BP _____ mmHg *สำหรับเด็ก น้ำหนัก < 40 kg Load RLS 20 ml/kg IV in 15 min	ROUTINE LAB ☒ Blood for CBC, BUN, Cr, Electrolyte, PT, PTT, INR, ฝื่อ tube G/M ☒ G/M PRC _____ units, FFP _____ CC ☒ Hct stat = _____ % ☒ DTX stat = _____ mg/dL (สำหรับผู้ป่วยที่อายุ ≥ 18 ปี) INITIAL RESUSCITATION ☐ เปิด IV 2 เส้น (เบอร์ 16 หรือ 18) ☐ warm RLS 500 mL IV load in 15 min x _____ ครั้ง รวม load RLS ไปทั้งหมด _____ mL (รวมแล้วไม่เกิน 1,000 mL) ☐ then RLS 1000 mL IV rate _____ mL/hr. ☐ PRC group O uncross-matched 1 unit IV push ☐ PRC _____ unit IV drip in _____ hr. ถ้า BP drop push PRC _____ units ☐ Retain Foley catheter ☐ monitor EKG ☐ Transamine 1 gm (4 amps) IV load in 10 min (for blunt chest/abdomen/Pelvic trauma)
A: AIRWAY AND C-SPINE RESTRICTION ☐ can talk ☐ clear voice ☐ C-spine midline not tender ☐	☐ open airway + on O2 mask with bag 10 LPM ☐ on hard collar ☐ tension pneumothorax Rt / Lt lung → needle decompression Rt / Lt ☐ on ETT No _____ depth _____ cm
B: BREATHING AND VENTILATION SpO2 แกร็บ _____ % room air ☐ Lung clear Lt = Rt ☐	☐ CXR portable ☐ Pelvis portable (if suspected pelvic fracture) or BP drop ไม่พบ cause of bleeding If presented with hemo-pneumothorax แล้วให้ใส่ ICD หลังจบ check list นี้ ☐ on ICD Rt / Lt lung No. _____ depth _____ cm

STANDING ORDER FOR MULTIPLE TRAUMA รพ.บ้านนา (หน้าที่ 2)

DATE AND TIME	ORDER FOR ONE DAY
C: CIRCULATION AND HEMORRHAGIC CONTROL Potential bleeding site: Chest Abdomen  ☐ peritonitis - Location: ☐ Thoraco-abdomen ☐ Anterior abdomen ☐ Rt / Lt Flank ☐ Back Pelvis Long bone External bleeding 	Chest (CXR) portable ☐ normal ☐ hemothorax Rt / Lt lung ☐ widening mediastinum ☐ _____ Abdomen ☐ Retain NG tube ต่อลง bag → NG content _____ ยกเว้น Maxillofacial injury อาจใส่ OG Tube ถ้ามี Air ใน Stomach มาก ☐ Retain Foley catheter สปีดสาวะ: _____, _____ CC ☐ FAST ultrasound at เวลา _____ : ☐ negative ☐ positive at _____ ☐ Repeat FAST ก่อน Refer เวลา _____ : Pelvis Film pelvis portable : _____ ☐ pelvic binder for open book pelvic fracture Long bone ☐ immobilization : on wooden splint / on slab _____ ☐ If opened fracture : NSS irrigate wound _____ litre , Consult Ortho External bleeding ☐ direct gauze pressure ☐ suture stop bleeding ถ้าไม่ได้ส่งสัย specific artery injury (superficial vessel suture ได้) ☐ Tourniquet at _____ start เวลา _____
D: DISABILITY GCS: E _____ M _____ V _____ Pupil _____ Motor grade  ☐ Traumatic brain injury (mild/ moderate/ severe) ☐ suspected C-spine injury	☐ Consult NeuroSx นครนายก if presented with traumatic brain injury ☐ CT brain NC ☐ CT brain NC includes C-spine
E: EXPOSURE AND ENVIRONMENT Log roll maneuver and PR exam:	- PR exam: _____, sphincter tone: ☐ loose ☐ normal - Keep warm

SECONDARY SURVEY

“AMPLE” (Allergy / Medications / Past history, Pregnancy / Last oral intake (NPO time) / Events (mechanisms of injury)

Consult ☐ Gen Sx ☐ Uro Sx _____ ☐ Neuro Sx ☐ Ortho _____
